

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

## 第1類医薬品

**劇** **ガラナポン**

勃起障害・  
射精障害改善薬

本剤の主成分であるヨヒンビン塩酸塩は西アフリカ地方特産のヨヒンベというアカネ草科の植物の葉や樹皮中に含まれるアルカロイドが起原でその作用は勃起中枢にはたらきかけ、生殖器血管を拡張させ、充血をもたらす作用があります。勃起力が充分でない人、性欲もあり勃起能力もあるが性交時に勃起しない人或いは途中で萎えてしまう人に、これら諸症状の改善、回復のために服用していただきたい医薬品です。ただし、脊髄に支障がある人、外傷などで陰茎にくる神経がおかされている人は、効果が期待できないことがあります。



### 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないこと
  - (1) 小児。
  - (2) 女性。
  - (3) 低血圧症または高血圧症の人。
  - (4) 心臓、肝臓、腎臓に疾患のある人。
  - (5) 泌尿器、生殖器に炎症のある人。
  - (6) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (7) 消化器に急性または慢性の疾患のある人。
2. 服用後、乗り物または機械類の運転操作をしないこと
3. 本剤を服用している間は、同じ成分を含んだその他の医薬品を服用しないこと
4. 服用時は飲酒しないこと
5. 空腹時の服用



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
  - (1) 現在、医師の治療を受けている人。
  - (2) 他の薬を使用している人（他の薬に影響を与えることがあります。）
  - (3) 心臓、肝臓、腎臓に既往歴のある人。
  - (4) 薬や化粧品でアレルギー症状（発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれ等）を起こしたことがある人。
  - (5) 本人または家族がアレルギー体質の人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師に相談すること
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれ
消化器	胃痛、腹部膨満感、はき気
精神神経系	めまい、発汗、虚脱感
循環器系、その他	血圧の増大、どうき、唾液分泌過多、ほてり、眼の充血

- (2) 2～3週間服用しても症状の改善がみられない人。
- (3) 誤った飲み方をしてしまった人。

裏面もお読みください。

## ■ 有効成分と働き ■

本品3錠(1日服用量)中に次の有効成分を含んでいます。

有効成分	3錠(300mg)中	働き
ヨヒンビン塩酸塩	15mg	勃起中枢に作用し、生殖器血管を拡張します
ガラナエキス	0.9mg	中枢神経を興奮させたり、胃酸分泌を亢進します

添加物として、アルギン酸ナトリウム、乳糖水和物、タルク、ステアリン酸カルシウムを含有する。

## ■ 効 能 ■

老衰性陰萎、衰弱性射精、神経衰弱性陰萎。

### 【用語の解説】

老衰性陰萎：加齢にともなう精巣機能の衰えによる陰茎の張力の低下や勃起の低下を指します。

衰弱性射精：陰茎の射出収縮の低下や射精圧の低下により生じる症状で、はっきり認識できる射精過程をとまなわない射精を指します。

神経衰弱性陰萎：ストレスや自信喪失等により、勃起させようとすればする程勃起できないか、できてもその強さが弱く、また持続時間の短いものを指します。

## ■ 用法及び用量 ■

大人1回1錠1日3回服用する。小児は用いず。

## ■ 詳しい服用方法 ■

大人1回1錠を、1日3回食後に水またはお湯で服用してください。

胃酸の分泌を促す作用がありますので、空腹時の服用は、お避けください。

## ■ 保管及び取扱い上の注意 ■

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

— お問い合わせ先 —

大東製薬工業株式会社 お客様相談室

電話 0120-246-717

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00

(土、日、祝祭日、弊社休業日を除く)

製造販売元 **大東製薬工業株式会社**  
山梨県甲府市川田町字正里624番地2 (アリア207)

裏面もお読みください。