


この添付文書は服用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう本剤とともに保管してください。



かぜ薬 コデジール[®]A錠

かぜをひくと発熱、せき、鼻水など不快な症状のために気分がすぐれず、仕事や日常の生活に差し支えるとともに、睡眠不足や体力の消耗をきたすことがあります。かぜは早めに適切な手当と養生をすることが必要です。

コデジールA錠は、古くからかぜの熱に用いられてきた地竜と、せきをしずめ、たんを切れ易くするカンゾウをはじめ、解熱鎮痛剤、鎮咳去痰剤、抗ヒスタミン剤などを配合したかぜ薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください。
 - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
- 服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気があらわれることがあります。)
- 服用時は飲酒しないでください。
- 長期連用しないでください。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 授乳中の人
 - 高齢者
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人 高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振	そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸 (皮ふや白目が黄色くなる) 等があらわれる。
間 質 性 肺 炎	空せき (たんを伴わないせき) を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜ ん そ く	

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
便秘、口のかわき

■ 効能・効果

かぜの諸症状（発熱、頭痛、せき、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、悪寒、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

■ 用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に、水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
15歳以上（大人）	3 錠	3 回
11歳以上 15歳未満	2 錠	
11歳未満	服用しないこと	

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分・分量

9錠（大人1日量）中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	は た ら き
地 竜 エ キ ス 散 - N	150 mg (原生薬300mgに相当)	熱を下げる
カ ン ゾ ウ エ キ ス 末	135 mg (原生薬945mgに相当)	炎症をしずめ、たんを出しやすくする
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン	810 mg	熱を下げ、痛みをやわらげる
マ レ イ ン 酸 ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン	7.5 mg	鼻水・くしゃみをおさえる
リ ン 酸 ジ ヒ ド ロ コ デ イン	21 mg	せきをしずめ、たんを切る
d _l -塩酸メチルエフェドリン	60 mg	せきをしずめ、たんを切る
無 水 カ フ ェ イ ン	75 mg	頭痛をやわらげる

添加物として乳糖、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ポビドン、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、白糖、タルク、炭酸Ca、アラビアゴム、ゼラチン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、カルナウバロウを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)一度開栓した後は、品質保持の点からなるべく早めに服用してください。
- (5)使用期限の経過した製品は服用しないでください。

かぜの養生法

- 外出をできるだけ避け、入浴は差し控えてください。
- 早めにかぜ薬を正しく服用してください。
- 部屋はなるべく暖かく（17～20℃）保ち、蒸気を立たせる工夫をしてください。
- 下着は清潔なものを着用し、発汗後はタオルで身体を拭き、着替えてください。
- 睡眠を十分に取り、消化のよい栄養価の高い物を食べるよう心掛けてください。
- うがい等をして、喉を保護するよう心掛けてください。

■ お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。
日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口（土、日、祝日を除く）
電話 0748-52-1231(代) 受付時間 8時30分～17時