＊＊印：2009年06月改訂

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読める様に大切に保存して下さい。

コランエースW

＊第②類医薬品

「こり」の原因、精神的、肉体的な諸原因で体内に生じた種々の老廃物質がだんだんと肩項部に蓄積され、これらが運び去られることなく、うっ血し筋肉が収縮している状態が「こり」の現象です。コランエースWは生体の自然良能（病気を自ら治そうとする力）を助け、肩こりの症状の改善治ゆに奏効します。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと　（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用、事故が起こりやすくなる）

1．次の人は服用しないこと。

(1)　本剤による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、浮腫等）を起こしたことがある人。

(2)　本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2．本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）。

3．服用時は飲酒しないこと。

4．長期連用しないこと。

相談すること

1．次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。

(1)　医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2)　妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)　高齢者。

(4)　本人又は家族がアレルギー体質の人。

(5)　薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6)　次の症状のある人。　高熱

(7)　次の診断を受けた人。　心臓病、高血圧、腎臓病

2．次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

(1)　服用後、次の症状があらわれた場合。

皮膚－発疹・発赤、かゆみ　　消化器－悪心・嘔吐、食欲不振　　精神神経系－めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック（アナフィラキシー）	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重たくなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
ぜんそく	

(2)　5～6回服用しても症状がよくならない場合。

効能・効果　肩こり、感冒

用法・用量　大人1回1包、1日3回服用する。

服用について　胃腸が虚弱な人は食後に服用して下さい。

成分・分量

プレノーゲン（カッコン抽出成分）……800mg

3包（4.5g）中 { シャクヤク600mg、オウバク200mg / マオウ4,000mg、ショウキョウ500mg / カンゾウ500mg } のエキス分……800mg

ケイヒ末2,825mg、ニコチン酸アミド75mg

保管および取り扱い上の注意

(1)　直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

(2)　小児の手の届かない所に保管すること。

(3)　他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

本剤をご使用になられて、変った症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元

有限会社　日本漢方医薬研究所

＊＊徳島県鳴門市北灘町櫛木字井ノ尻89-7

電　話：088－666－0678

ホームページ：http://www2u.biglobe.ne.jp/~jhm/

受付時間：10：00～17：00（土、日、祝日を除く）