

この添付文書は服用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう本剤とともに保管してください。なお、医薬品の作用は、体質又は体調により異なることがありますので、本剤を自ら服用されるために購入された以外の方が服用される場合は、あらかじめ本剤の購入先にご相談ください。



総合感冒薬

ハイドルミン顆粒

第②類医薬品

ハイドルミン顆粒は、古くからかぜに用いられてきた和漢薬の地竜、甘草、桂皮、生姜、桔梗をはじめ、解熱鎮痛剤、鎮咳去痰剤、抗ヒスタミン剤などを配合したかぜ薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- (3)15歳未満の小児
- (4)出産予定日12週以内の妊婦

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気があらわれることがあります。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

5. 服用時は飲酒しないでください。

6. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人
- (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5)次の症状のある人 高熱、排尿困難
- (6)次の診断を受けた人 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振	そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

便秘、口のかわき

■ 効能・効果

かぜの諸症状（悪寒、発熱、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

■ 用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上（大人）	1包	3回
15歳未満	服用しないこと	

※定められた用法・用量を厳守してください。

■ 成分・分量

3包（1日量）中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
地竜エキス散	150mg (原生薬300mgに相当)	熱を下げます。
キキョウ乾燥エキス	50mg (原生薬500mgに相当)	たんを切り、せきをしずめます。
カンゾウエキス末	110mg (原生薬770mgに相当)	せきをしずめ、たんを切ります。
ケイヒ末	400mg	発汗をうながし、おだやかに熱を下げます。
ショウキョウ末	100mg	
アスピリンアルミニウム	1,530mg	痛みをおさえ、熱を下げます。
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	150mg	たんを切ります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりをおさえます。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。

添加物としてバレイショデンプン、セルロース、無水ケイ酸、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)使用期限の経過した製品は服用しないでください。

■ その他

本剤は生薬成分及び生薬抽出成分を配合していますので、製品により顆粒の色が多少異なる場合がありますが、薬効にかわりはありません。

■ お問い合わせ先

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

消費者相談窓口 日新製薬株式会社

TEL 0120-967-862

FAX (0748)-62-3417

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

発売元

日新製薬株式会社
滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62

製造販売元

日野薬品工業株式会社
滋賀県蒲生郡日野町上野田119